

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 45 DE JUIN 1964

Le 10 Juin 1964

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

Carpocapse des pommes et des poires :

Les premières chenilles vont apparaître dans les départements de l'Aisne - Sud des Ardennes - Meuse - Marne - Haute-Marne. Il est conseillé d'appliquer un traitement dès réception de l'Avertissement avec l'un des produits conseillés.

Pour la Thiérache et le Nord des Ardennes :

Attendre un avis ultérieur.

INFORMATION

Pucerons :

Les contaminations sont assez importantes dans certains vergers - appliquer un traitement à l'aide d'un produit systémique.

VIGNE

AVERTISSEMENT

Vers de la grappe (rappel) :

Dans les vignobles où, faute d'un traitement en temps utile, on constate la présence de vers, il est encore possible d'intervenir avec un des produits "curatifs" recommandés dans notre avertissement du 26 Mai: parathion éthyl ou méthyl, diazinon, malathion, E.P.N., mévinphos, azinphos.

INFORMATIONS

Mildiou :

Dans le cas ou de fortes précipitations ou des chutes de grêle justifiaient localement l'application d'un traitement durant la floraison, celui-ci devrait être réalisé de préférence avec un produit organique, les produits cupriques risquant de provoquer des accidents durant cette période.

DLP-13-6-64 307391

7 1100

Oïdium :

Durant la floraison les traitements par poudrage sont plus particulièrement conseillés.

GRANDE CULTURE.

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre :

A réception, il est conseillé de réaliser un traitement contre cette maladie dans les cultures :

- ayant reçu de très fortes précipitations orageuses
- ou situées dans des secteurs très favorables à la maladie : bas-fonds humides, proximité de bois etc...

Ce traitement ne doit donc constituer qu'une exception, et n'intéresser que des surfaces réduites.

INFORMATION

Charançon des siliques sur colza de printemps :

Les pullulations paraissent faibles. Toutefois surveiller attentivement les colzas et traiter sans délai si l'on remarque en moyenne un charançon par plante. Les colzas étant surtout envahis par des femelles prêtes à pondre, il est bon d'intervenir sans délai dès ce seuil atteint.

Les Contrôleurs chargée des
Avertissements agricoles,

L'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique de REIMS,

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE • Directeur-Gérant : L. BOUYX.